

Schiedamse Vest 180

3011 BH Rotterdam

T +31 (0)10 401 77 77

www.oogziekenhuis.nl

Hechtingen verwijderen

Deze folder geeft u informatie over het verwijderen van hechtingen.

Afspraak

De hechtingen van uw hoornvliestransplantatie kunnen worden verwijderd. Afhankelijk van het aantal hechtingen dat verwijderd gaat worden, zijn er voor u één of twee afspraken gemaakt.

Het verwijderen van hechtingen wordt op twee locaties in Het Oogziekenhuis uitgevoerd. De keuze voor de locatie is afhankelijk van de hechtingen en de verdovingsvorm. U hoort van tevoren van uw oogarts waar uw afspraak plaatsvindt:

Poliklinische operatiekamer (Poli-OK)

- Op de dag van de afspraak meldt u zich op de 1e etage bij balie 10. Tijdens de behandeling ligt u in een comfortabele stoel (net zoals bij de tandarts). U krijgt een ooglidspreader tussen de oogleden zodat u niet kunt knipperen. Het is ook mogelijk dat de behandelend arts u laat plaatsnemen achter de spleetlamp, dit is het instrument dat ook gebruikt wordt tijdens normale polikliniekbezoeken.
- *Grote operatiekamer (OK)*
De behandeling vindt plaats op de operatiekamer. Op de dag van de afspraak meldt u zich op de 2e etage bij balie 28.

Het Oogziekenhuis levert een belangrijke bijdrage aan de opleiding van oogartsen om de zorg voor de toekomst te waarborgen. Dit betekent dat de behandeling (deels) uitgevoerd kan worden door een arts in opleiding tot oogarts. Er is altijd een gespecialiseerde oogarts aanwezig voor eventueel benodigde supervisie.

Verdoving

Er zijn drie soorten verdoving mogelijk bij deze operatie:

- *Plaatselijke verdoving van het oog door middel van druppels*
Bij deze verdovingsvorm wordt alleen het oppervlak van het oog verdoofd, waardoor het ongevoelig wordt voor scherpe pijn. Aanraking van het oog en vloeistoffen voelt u nog wel. Tijdens de behandeling kunt u blijven zien en u kunt uw oog bewegen. Bij een plaatselijke verdoving kunt u van tevoren gewoon eten en drinken.
- *Plaatselijke verdoving van het oog door middel van een injectie bij het oog (subtenon anesthesie)*
Bij deze verdovingsvorm krijgt u een prik bij het oog (langs de oogbol). Deze verdoving is niet alleen bedoeld om de operatie pijnvrij te maken, maar ook om de bewegingen van het oog te verminderen. Hierdoor kan het zicht tijdelijk verminderd zijn. Tijdens de behandeling bent u wakker en aanspreekbaar.

- *Algehele verdoving (narcose)*

Bij een algehele verdoving (narcose) krijgt u een slaapmiddel door middel van een infuus toegediend. U valt in slaap en wordt pas na afloop van de behandeling weer wakker. Meer informatie vindt u in de folder 'Verdoving voor uw operatie'.

Na de afspraak

Direct na de behandeling kunt u naar huis. Vanwege de nawerking van de verdoving mag u de eerste 24 uur niet actief deelnemen aan het verkeer (zelf autorijden of fietsen). U dient een begeleider mee te nemen die u na de afspraak naar huis brengt.

Instructies

Na de behandeling dient u gedurende 5 tot 7 dagen de voorgeschreven antibioticadruppels toe te dienen. Soms worden ook ontstekingsremmende oogdruppels voorgeschreven (combinatiedruppels zijn ook mogelijk). Heeft u geen recept meegekregen (of bent u bijvoorbeeld allergisch voor de druppels), meldt u dit dan voorafgaand aan uw afspraak.

Mogelijke klachten

U heeft gedurende ongeveer 2 tot 3 dagen het gevoel of er iets in uw oog zit; dit is normaal. Tegen de pijn of irritatie kunt u paracetamol innemen (3 maal daags 2 tabletten van 500mg bij een normaal lichaamsgewicht). Eventueel kunt u hieraan Naproxen of Brufen (NSAID) toevoegen volgens de bijsluiter.

Als u iets niet vertrouwt gedurende de dagen na het verwijderen, neemt u dan contact op met de afdeling Acute Oogzorg. Met name als er veel vocht uit uw oog komt (meer dan normale tranen) of als het oog zeer rood en slechtziend wordt, moet u direct contact opnemen met de afdeling Acute Oogzorg.

De afdeling Acute Oogzorg is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar:

- maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 17.00 uur: 010 401 77 27;
- overige tijden: 010 401 77 77.

Veranderende brilsterkte

Na het verwijderen van de hechtingen zal waarschijnlijk de brilsterkte veranderen (met name de cilindrische sterkte). Uw oogarts probeert het verwijderen van de hechtingen zo te plannen, dat dit effect zo klein mogelijk blijft. Echter, de veranderingen kunnen soms groter zijn dan eerder verwacht. Dit is inherent aan de aard van uw hoornvliestransplantatie.

Controle

Enkele weken na het verwijderen van de hechtingen vindt de controle plaats op het spreekuur bij uw oogarts. De controleafspraak wordt van tevoren alvast voor u gepland.

Meer info

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen bij de volgende afspraak of kunt u contact opnemen met de corneaverpleegkundigen via de telefonische helpdesk. Zij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 10.00 - 11.00 uur en tussen 14.00 - 14.45 uur op het telefoonnummer 010 402 33 08.

De informatie in deze patiëntenfolder kunt u terugvinden op www.oogziekenhuis.nl.